

Antipsychotics and Sexual Functioning Questionnaire (ASFQ)©

ASFQ, copyright 2013, beschikbaar in het publieke domein
Universitair Centrum Psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Groningen
H. Knegtering, S. Castelein en M.K. de Boer

Patiëntgegevens:

- Naam:
- Geboortedatum, geslacht:(dd/mm/jjjj), m/v
- Naam ziekenhuis, patiëntnummer:
- Datum:.....(dd/mm/jjjj)

Instructie voor interviewers:

We willen u vragen om dikgedrukte tekst en vragen hardop voor te lezen aan de patiënt. Het is de bedoeling dat u doorgaat met vragen stellen tot het antwoord duidelijk is of het niet mogelijk is om verdere verduidelijking te verkrijgen. Noteer veranderingen die mogelijk gerelateerd zijn aan het gebruik van het huidige antipsychoticum. Vergelijk daarbij het huidige seksueel functioneren met seksueel functioneren ooit eerder in het leven.

Interpretatie van de volgende antwoordmogelijkheden:

0. Onbekend wordt gescoord indien de patiënt niet bereid of in staat is om deze vraag te beantwoorden, of indien ondanks voldoende doorvragen geen duidelijk antwoord kan worden verkregen.
1. Sterk verminderd wordt gescoord indien de patiënt een sterke afname ervaart in seksueel functioneren en/of de patiënt sterk lijdt onder de afname in seksueel functioneren.
2. Verminderd wordt gescoord indien de patiënt een afname in seksueel functioneren ervaart, zonder dat dit voor de patiënt erg hinderlijk is.
3. Onveranderd wordt gescoord indien de patiënt geen verandering ervaart in seksueel functioneren ten gevolge van het gebruik van antipsychotische medicatie. Het is belangrijk om op het volgende punt te letten: sommige patiënten geven aan dat ze nooit seksuele interesse hebben gehad. Als dit het geval is, en dit niet is veranderd, dan wordt 'onveranderd' gescoord.
4. Toegenomen wordt gescoord als de patiënt een toename in seksueel functioneren ervaart sinds het gebruik van het huidige antipsychoticum.
5. Sterk toegenomen wordt gescoord als de patiënt een sterke toename ervaart in seksueel functioneren sinds het gebruik van het huidige antipsychoticum.

Vragen:

1. Indicatie voor het gebruik van het huidige antipsychoticum:

.....

2. Noteer hier alle medicatie die voor het huidige antipsychoticum is gebruikt (met dosering; ook andere middelen dan antipsychotica):

.....
.....

3. Hoe lang heeft u het vorige antipsychoticum gebruikt?

1. Er werd de laatste maand voor het huidige antipsychoticum geen antipsychoticum gebruikt
2. < 1 week
3. 1-2 weken
4. 2-6 weken
5. 6 weken - 3 maanden
6. > 3 maanden

4. Wat was de reden om met het vorige antipsychoticum te stoppen?

1. Nieuwe psychotische episode
2. Onvoldoende effect
3. Bijwerkingen
4. Wetenschappelijk onderzoek
5. Anders, namelijk.....

5. Huidige medicatie (antipsychoticum en comedatie, inclusief dosering):

.....
.....

6. Kunt u het effect beschrijven van de huidige antipsychotische medicatie? Hoe gaat het momenteel met u?

(De score is gebaseerd op de mening van de patiënt en de klinische impressie van de interviewer.)

0. Onbekend
1. Sterk verslechterd
2. Verslechterd
3. Onveranderd
4. Verbeterd
5. Sterk verbeterd

7. Welke ongewenste effecten heeft u ervaren van het huidige antipsychoticum?

(Noteer ongewenste effecten die spontaan worden genoemd door de patiënt, die gerelateerd kunnen zijn aan het antipsychoticum dat de afgelopen vier weken is gebruikt. Noteer hier geen bijwerkingen die later tijdens dit interview worden genoemd door de patiënt.)

.....
.....

Vragen over seksueel functioneren

Sommige patiënten merken een verandering in hun seksuele verlangens of functioneren als ze medicijnen gebruiken. Veranderingen in seksueel functioneren kunnen gemerkt worden tijdens het vrijen met een ander of bij zelfbevrediging. Sommige patiënten melden een verbetering in het seksueel functioneren, anderen een verslechtering. De volgende vragen gaan over uw situatie in de laatste vier tot zes weken.

♂♀ **8. Seksueel verlangen:**

Heeft u een verandering gemerkt in seksueel verlangen sinds u het huidige antipsychoticum gebruikt?

0. Onbekend
1. Sterk afgenomen
2. Afgenomen
3. Onveranderd
4. Toegenomen
5. Sterk toegenomen

♂♀ **9. Orgasme:**

Heeft u een verandering gemerkt in het krijgen van een orgasme (klaarkomen) sinds u het huidige antipsychoticum gebruikt?

0. Onbekend
1. Sterk afgenomen
2. Afgenomen
3. Onveranderd
4. Toegenomen
5. Sterk toegenomen

♂♀ **10. Tepeluitvloed:**

Heeft u in de afgelopen vier tot zes weken uitvloed uit de tepels gehad?

0. Onbekend
1. Ja
2. Nee

♂♀ **11. Zwelling van borsten:**

Heeft u in de afgelopen vier tot zes weken een vergroting van de borsten en/of de tepels opgemerkt?

0. Onbekend
1. Ja
2. Nee

Vragen voor mannen

Voor vrouwen, ga naar vraag 15.

♂ **12. Erectie:**

Heeft u een verandering gemerkt in het kunnen krijgen van een erectie (stijve penis) sinds u het huidige antipsychoticum gebruikt? (bijv. de mate van stijfheid of de tijdsduur om een erectie te krijgen of te houden)

(Instructie: priapisme betreft een aanhoudende ongewenste erectie die pijnlijk is en langer dan een uur aanhoudt zonder seksuele stimulatie. Priapisme moet onmiddellijk worden behandeld.)

0. Onbekend
1. Sterk afgenomen
2. Afgenomen
3. Onveranderd
4. Toegenomen
5. Sterk toegenomen
6. Priapisme

♂ **13. Ejaculatie:**

Heeft u een verandering gemerkt in de hoeveelheid sperma (zaad) dat vrijkomt bij een orgasme sinds u het huidige antipsychoticum gebruikt? (bijv. minder of meer sperma dan normaal, of kwam er geen sperma vrij?)

0. Onbekend
1. Sterk afgenomen
2. Afgenomen
3. Onveranderd
4. Toegenomen
5. Sterk toegenomen

♂ **14. Seksueel contact:**

Heeft u in de afgelopen vier tot zes weken seksueel contact (gemeenschap) gehad met een partner?

1. Ja
2. Nee

Einde vragenlijst voor mannen

Vragen voor vrouwen

♀ **15. Anticonceptie:**

Gebruikt u hormonale anticonceptie?

0. Onbekend
1. Ja. Welke methode? (bijv. 'de pil', prikpil, spiraaltje, hormonale ring).....
2. Nee

♀ **16. Menstruatie:**

Is de menstruatie (ongesteldheid) de afgelopen vier tot zes weken uitgebleven?

0. Onbekend
1. Ja. Datum laatste menstruatie...../...../..... Oorzaak: zwangerschap / menopauze / anders / onbekend.
2. Nee

♀ **17. Lubricatie:**

Heeft u een verandering gemerkt in de vaginale vochtigheid (het 'nat' worden) wanneer u seksueel opgewonden was (bijvoorbeeld tijdens het vrijen met een partner of bij zelfbevrediging) sinds u het huidige antipsychoticum gebruikt?

0. Onbekend
1. Sterk afgenomen
2. Afgenomen
3. Onveranderd
4. Toegenomen
5. Sterk toegenomen

♀ **18. Seksueel contact**

Heeft u in de afgelopen vier tot zes weken seksueel contact (gemeenschap) gehad met een partner?

1. Ja, ga verder naar de volgende vraag
2. Nee, einde vragenlijst

♀ **19. Pijn bij seksueel contact (gemeenschap):**

Heeft u pijn bij het vrijen met een partner en is dit veranderd sinds u het huidige antipsychoticum gebruikt?

0. Onbekend
1. Verslechtering
2. Onveranderd
3. Verbetering

Einde vragenlijst

Referentie:

de Boer, M. K., Castelein, S., Bous, J., van den Heuvel, E. R., Wiersma, D., Schoevers, R. A., & Knegtering, H. (2013). The Antipsychotics and Sexual Functioning Questionnaire (ASFQ): Preliminary evidence for reliability and validity. *Schizophrenia Research, 150*(2-3), 410-415.